Πανεπιστημιο Κρητης – Τμημα Μαθηματικων και Εφαρμοσμενων Μαθηματικων

Λύσεις των ασκήσεων

Στις παρακάτω ασκήσεις εμφανίζεται ο συμβολισμός $\mathbf{1}\,(\text{συνθήκη})$. Αυτό ισούται με 1 αν ισχύει η συνθήκη και με 0 αν όχι. Π.χ. αν $A \subseteq \mathbb{R}$ τότε η χαρακτηριστική συνάρτηση του A γράφεται και ως $\chi_A(x) = \mathbf{1}\,(x \in A)$. Ένα άλλο παράδειγμα: η χαρακτηριστική συνάρτηση του συνόλου $B = [0,1] \cup (3,5]$ είναι η

$$\chi_B(x) = \mathbf{1}\,(0 \le x \le 1) + \mathbf{1}\,(3 < x \le 5)\,.$$

Η συνάρτηση που δίνεται από τον τύπο $f(x) = \begin{cases} -x & \text{αν } x \le 0 \\ x^2 & \text{αν } x > 0 \end{cases}$ μπορεί να γραφεί και ως

$$f(x) = -x\mathbf{1}\,(x \le 0) + x^2\mathbf{1}\,(x > 0)\,.$$

Πρ. 1 Βρείτε, αν υπάρχει, το κατά σημείο όριο των παρακάτω ακολουθιών συναρτήσεων:

$$\text{(a) } f_n : [0,1] \to \mathbb{R},\ f_n(x) = \frac{1}{nx^2}\mathbf{1}\left(\frac{1}{n} < x \le 1\right) + n^2 x\mathbf{1}\left(0 \le x \le \frac{1}{n}\right),$$

$$\text{(b) } g_n : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R},\ g_n(x) = \frac{x}{n}\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor$$

Λύση: (a) Για κάθε σταθερό $x > 0$ η συνθήκη $0 \le x \le \frac{1}{n}$ παύει να ισχύει μετά από κάποιο n_0 άρα για αρκετά μεγάλο n έχουμε $f_n(x) = \frac{1}{nx^2}$ το οποίο τείνει στο 0 για σταθερό x και $n \to \infty$. Αν $x = 0$ τότε $f_n(x) = 0$ για κάθε n. Άρα η οριακή συνάρτηση υπάρχει και είναι η $f(x) = 0$.

(b) Ας ορίσουμε $t = \frac{n}{x}$ για σταθερό x (η ποσότητα t είναι συνάρτηση του n αλλά επιλέγουμε, για να μην επιβαρύνουμε το συμβολισμό, να μην το δείχνουμε αυτό γράφοντας, π.χ., t_n ή $t(n)$). Αν $x > 0$ τότε αν $n \to \infty$ έχουμε $t \to \infty$ (ενώ αν $x < 0$ έχουμε $t \to -\infty$). Οπότε

$$g_n(x) = \frac{\lfloor t \rfloor}{t},$$

και είναι φανερό ότι

$$\frac{t-1}{t} \le g_n(x) \le 1,$$

άρα $g_n(x) \to 1$ (το ίδιο ισχύει και για $x < 0$). Η οριακή συνάρτηση είναι η $g(x) = 0$ για $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Πρ. 2 Η $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ είναι παντού συνεχής. Δείξτε ότι $\int_0^1 \left|f(x + \frac{1}{n}) - f(x)\right| dx \to 0$ για $n \to \infty$.

Λύση: Αν $x \in [0,1]$ τότε $x + \frac{1}{n} \in [0,2]$, άρα στον υπολογισμό του ολοκληρώματος μπορούμε να θεωρήσουμε την f ως ορισμένη και συνεχή μόνο στο διάστημα $[0,2]$, οπότε αυτόματα η f είναι και ομοιόμορφα συνεχής. Έστω $\epsilon > 0$. Από την ομοιόμορφη συνέχεια της f έχουμε ότι υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \le \epsilon.$$

Αν $\frac{1}{n} < \delta$ (δηλ. για αρκετά μεγάλο n) θα έχουμε συνεπώς $\left|f(x + \frac{1}{n}) - f(x)\right| \le \epsilon$ για κάθε $x \in [0,1]$, οπότε και το άνω ολοκλήρωμα είναι $\le \epsilon$. Αυτό σημαίνει ότι πάει στο 0 για $n \to \infty$.

Πρ. 3 Αν $A \subseteq \mathbb{R}$ συμβολίζουμε με $C(A)$ το σύνολο όλων των συναρτήσεων $f : A \to \mathbb{R}$ που ειναι συνεχείς παντού στο A. Για $f, g \in C([0,1])$ ορίζουμε

$$d(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\, dx.$$

Αποδείξτε ότι η συνάρτηση $d(f,g)$ ικανοποιεί τα αξιώματα της μετρικής στο χώρο $C([0,1])$.

Λύση: Το ότι $d(f,g) \geq 0$ είναι προφανές. Το ότι $d(f,g) = 0 \Longrightarrow \forall x \in A : f(x) = g(x)$ είναι συνέπεια της συνέχειας των f, g. Πράγματι αυτή συνεπάγεται ότι και η μη αρνητική συνάρτηση $|f(x) - g(x)|$ είναι συνεχής. Αν λοιπόν το ολοκλήρωμα της συνάρτησης αυτής είναι 0 έπεται ότι η συνάρτηση αυτή είναι παντού 0 (αυτό δε θα προέκυπτε αν δεν είχαμε τη συνέχεια), δηλ. $\forall x \in A : f(x) = g(x)$.

Η συμμετρική ιδιότητα $d(f,g) = d(g,f)$ είναι επίσης προφανής.

Για την τριγωνική ανισότητα $d(f,g) \leq d(f,h) + d(h,g)$ δεν έχουμε παρά να ολοκληρώσουμε στο A την ανισότητα (συνέπεια της τριγωνικής ανισότητας για αριθμούς)

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|.$$

Πρ. 4 Ένα σύνολο $X \subseteq C([0,1])$ λέγεται φραγμένο αν υπάρχει $g \in C([0,1])$ και $M > 0$ τέτοια ώστε

$$\forall f \in X : \quad \rho(f,g) \leq M.$$

Αν $f, f_n \in C([0,1])$ και $f_n \to f$ ομοιόμορφα στο $[0,1]$ δείξτε ότι το σύνολο

$$\{f_1, f_2, f_3, \ldots\}$$

είναι φραγμένο.

Λύση: Αφού $f_n \to f$ ομοιόμορφα στο $[0,1]$ υπάρχει κάποιο n_0 τέτοιο ώστε για $n > n_0$ να έχουμε $|f_n(x) - f(x)| \leq 1$. Κάθε συνεχής συνάρτηση στο $[0,1]$ είναι φραγμένη, άρα υπάρχει $M > 0$ τέτοιο ώστε $|f(x)| \leq M$ για κάθε $x \in [0,1]$. Μαζί με την προηγούμενη ανισότητα και χρησιμοποιώντας την τριγωνική ανισότητα παίρνουμε ότι για κάθε x έχουμε

$$|f_n(x)| \leq M + 1, \quad (\text{για } n > n_0).$$

Αφού οι $f_1, f_2, \ldots, f_{n_0}$ είναι συνεχείς στο $[0,1]$ έπεται ότι είναι φραγμένες εκεί και παίρνοντας M' να είναι μεγαλύτερο από όλες τις ποσότητες

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_j(x)|, \quad (\text{για } j = 1, 2, \ldots, n_0),$$

έχουμε

$$|f_n(x)| \leq \max\{M+1, M'\}, \quad (\text{για } n \in \mathbb{N}).$$

Αυτό σημαίνει $\rho(f_n, 0) \leq \max\{M+1, M'\}$, άρα το σύνολο $\{f_1, f_2, \ldots\}$ είναι φραγμένο.

Πρ. 5 (Δείτε Πρόβλημα 3 για ορολογία.) Στο χώρο $C([0,1])$ έχουμε δύο μετρικές την $d(f,g)$ που ορίσαμε στο Πρ. 3 και την $\rho(f,g) = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|$. Αν $f, f_n \in C([0,1])$ αποδείξτε τη συνεπαγωγή

$$\rho(f_n, f) \to 0 \Longrightarrow d(f_n, f) \to 0.$$

Λύση: Έχουμε την ανισότητα

$$0 \leq d(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\, dx \leq \int_0^1 \rho(f,g)\, dx = \rho(f,g),$$

οπότε το ζητούμενο είναι φανερό.

Πρ. 6 Δείξτε ότι η συνεπαγωγή του Προβλήματος 5 δεν αντιστρέφεται. Με άλλα λόγια βρείτε $f, f_n \in C([0,1])$ τέτοια ώστε $d(f_n, f) \to 0$ αλλά χωρίς να ισχύει $\rho(f_n, f) \to 0$.
Υπόδειξη: Πάρτε $g_n(x) = x^n$.

Λύση: Ακολουθούμε την υπόδειξη. Το κατά σημείο όριο της $g_n(x) = x^n$ στο $[0,1]$ είναι η συνάρτηση

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

η οποία είναι ολοκληρώσιμη συνάρτηση. Επίσης

$$\int_0^1 |g_n(x) - g(x)|\, dx = \int_0^1 x^n\, dx = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

Όμως $\rho(g_n, g) = 1$.

Μια άλλη λύση είναι η ακολουθία συναρτήσεων $f_n(x)$ που ορίζεται ως εξής: η f_n είναι 0 εκτός του διαστήματος $[1/(n+1), 1/n]$ και εντός του διαστήματος αυτού το γράφημα της f_n είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο με βάση το διάστημα αυτό και ύψος 1. Η οριακή συνάρτηση είναι η ταυτοτικά μηδενική συνάρτηση και μπορείτε εύκολα να επαληθεύσετε τη ζητούμενη ιδιότητα.

Πρ. 7 Αν $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ είναι συνεχής και $\epsilon > 0$ δείξτε ότι υπάρχει πολυώνυμο $p(x)$ με ρητούς συντελεστές τέτοιο ώστε $|f(x) - p(x)| \leq \epsilon$ για $x \in [0,1]$.

Λύση: Από το θεώρημα του Weierstraß υπάρχει πολυώνυμο $q(x)$ τέτοιο ώστε $|f(x) - q(x)| \leq \epsilon/2$ για κάθε $x \in [0,1]$. Ας είναι n ο βαθμός του $q(x)$ και q_j οι συντελεστές του, γράφουμε δηλ. το $q(x)$ ως

$$q(x) = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + q_3 x^3 + \cdots q_n x^n.$$

Επιλέγουμε τώρα ρητούς αριθμούς p_j, για $j = 0, 1, \ldots, n$, τέτοιους ώστε $|p_j - q_j| \leq \frac{\epsilon}{2(n+1)}$. Από την τριγωνική ανισότητα έχουμε τότε

$$|p(x) - q(x)| \leq |p_0 - q_0| + |p_1 - q_1||x| + \cdots + |p_n - q_n||x|^n \leq (n+1) \max_j |p_j - q_j| \leq \frac{\epsilon}{2},$$

και άρα $|f(x) - p(x)| \leq \epsilon$ (και πάλι χρησιμοποιώντας την τριγωνική ανισότητα).

Πρ. 8 Βρείτε μια συνεχή $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ τέτοια ώστε για κάθε πολυώνυμο $p(x)$ να ισχύει

$$\rho(f,p) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - p(x)| = +\infty.$$

Λύση: Πάρτε $f(x) = e^x$. Αν $p(x)$ είναι πολυώνυμο τότε $e^x - p(x) \to +\infty$ για $x \to +\infty$, άρα το supremum στην εκφώνηση είναι $+\infty$.

Πρ. 9 (Μια πιο συγκεκριμένη μορφή του Προβλήματος 8.) Δείξτε ότι για κάθε $M > 0$ και $\epsilon > 0$ υπάρχει πολυώνυμο $p(x)$ τέτοιο ώστε $\rho(|x|, p(x)) = \sup_{-M \leq x \leq M} ||x| - p(x)| \leq \epsilon$. Δείξτε επίσης ότι δεν υπάρχει πολυώνυμο $q(x)$ τέτοιο ώστε

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} ||x| - q(x)| < \infty.$$

Λύση: Για το πρώτο απλά εφαρμόζουμε το θεώρημα προσέγγισης του Weierstraß στο διάστημα $[-M, M]$, όπου η συνάρτησή μας $|x|$ είναι συνεχής.

Αν $p(x)$ είναι πολυώνυμο με $\sup_{x \in \mathbb{R}} ||x| - q(x)| < \infty$ (είναι φραγμένη δηλ. η συνάρτηση $|x| - p(x)$) τότε το $p(x)$ δε μπορεί να έχει βαθμό > 1 γιατί τότε η διαφορά $p(x) - |x|$ θα έτεινε στο $+\infty$ για $x \to +\infty$, πράγμα που αντιφάσκει με την υπόθεσή μας για το $p(x)$. Άρα $p(x) = ax + b$ για κάποιους πραγματικούς αριθμούς a, b. Αν η διαφορά $ax + b - |x|$ είναι φραγμένη για $x > 0$ έπεται ότι $a = 1$. Τότε όμως η διαφορά $ax + b - |x|$ δεν είναι φραγμένη για $x < 0$, αφού είναι η συνάρτηση $2x + b$, άτοπο.

Πρ. 10 Αν η $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ είναι συνεχής και άρτια (δηλ. $f(-x) = f(x)$) και $\epsilon > 0$ δείξτε ότι υπάρχει πολυώνυμο $p(x)$ τέτοιο ώστε $\rho(f, p) \leq \epsilon$ και, επιπλέον, το $p(x)$ δεν έχει μονώνυμα περιττού βαθμού.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε το θεώρημα προσέγγισης του Weierstraß για να προσεγγίσετε την $f(x)$ και χρησιμοποιείστε το πολυώνυμο $p(x)$ που βρήκατε όπως και το $p(-x)$.

Λύση: Από το θεώρημα προσέγγισης του Weierstraß υπάρχει πολυώνυμο $p(x)$ τέτοιο ώστε $|f(x) - p(x)| \leq \epsilon$. Έπεται ότι το πολυώνυμο $p(-x)$ ικανοποιεί το ίδιο φράγμα $|f(x) - p(-x)| \leq \epsilon$ αφού $f(-x) = f(x)$. Έστω το πολυώνυμο $q(x) = \frac{1}{2}(p(x) + p(-x))$ το οποίο δεν έχει μονώνυμα περιττού βαθμού (αφού αυτά του $p(x)$ «σκοτώνουν» αυτά του $p(-x)$). Έχουμε

$$|f(x) - q(x)| = \frac{1}{2}|(f(x) - p(x)) + (f(x) - p(-x))| \leq \frac{1}{2}(\epsilon + \epsilon) = \epsilon.$$